

インフルエンザ予防接種予診票

※接種希望の方は太枠のみにご記入し当日ご持参ください。回答欄はどちらかに○印をつけてください。
※小学生・中学生の場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入し、同伴にて来院してください。

		診察前体温		度	分	(平熱		度	分)
住所						電話番号			
ふりがな			男・女	生年月日		明治	年	月	日
受ける人の氏名						大正			
						昭和	(満		才)
						平成			

	回答欄		医師記入欄
	いいえ	はい	
今日のインフルエンザの予防接種について、2ページ目の説明文を読んで理解しましたか？			
今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか？			
今日、身体の具合の悪いところはありますか？ 具体的な症状を書いてください()	はい	いいえ	
最近一ヶ月以内に熱が出たり、病気にかかりましたか？ 病名()	はい	いいえ	
現在何か病気にかかっていますか？ 病名()	はい	いいえ	
治療(投薬など)受けていますか？	はい	いいえ	
その病気の主治医には、今日の予防接種を受けて良いと言われましたか？	いいえ	はい	
今まで心臓病・腎臓病・肝臓病・血液疾患・免疫不全などの慢性疾患にかかり医師の診察を受けていますか？ 病名()	はい	いいえ	
その病気の主治医には、今日の予防接種を受けて良いと言われましたか？	いいえ	はい	
これまで間質性肺炎・気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断され、現在治療中ですか？	はい	いいえ	
近親者に先天性免疫不全と診断された方がいますか？	はい	いいえ	
最近一ヶ月以内に、家族や周囲で麻疹・風疹・水痘・おたふくかぜなどにかかった方がいますか？	はい	いいえ	
最近一ヶ月以内に予防接種を受けましたか？ 予防接種の種類()	はい	いいえ	
薬や食品(鶏肉・鶏卵など)で皮膚に発疹や蕁麻疹が出たり、身体の具合が悪くなったことはありますか？ 薬の名前()	はい	いいえ	
今までにけいれん(ひきつけ)を起こしたことはありますか？ 何歳頃()	はい	いいえ	
これまで予防接種を受けて具合が悪くなったことがありますか？ 予防接種の名前()	はい	いいえ	
近親者に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか？	はい	いいえ	
(女性の方に) 現在妊娠していますか？	はい	いいえ	
今日の予防接種について質問がありますか？ 具体的に()	はい	いいえ	

医師記入欄
以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は (実施できる ・ 見合わせた方がよい) と判断します。 本人または保護者に対して、予防接種の効果・副反応及び医薬品医療機器総合機構法に基づく救済について説明しました。
医師署名

本人(保護者)記入欄
医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種することに (同意します ・ 同意しません)
署名

ワクチンメーカー/ロット番号	摂取量	実施場所/医師名/接種年月日		
メーカー	皮下接種	実施場所	さとだ内科クリニック	
Lot No.	0.5 ml	医師名	里田 誠	
		接種年月日	令和	年 月 日

インフルエンザワクチンの接種について

インフルエンザの予防接種を実施するに当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、1枚目の予診票に出来るだけ詳しくご記入下さい。お子さんの場合には、健康状態をよく把握している保護者がご記入下さい。

ワクチンの効果と副反応

予防接種により、インフルエンザ感染を予防したり、症状を軽くすることができます。また、インフルエンザによる合併症や死亡を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれることがあります。通常は2~3日で消失します。発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・嘔気、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛なども起こることがありますが、通常は2~3日で消失します。過敏症として、発しん、じんましん、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみなどもまれに起こります。強い卵アレルギーのある方は、強い副反応を生じる可能性がありますので必ず医師に申し出て下さい。非常にまれですが、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー様症状(じんましん、呼吸困難など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)けいれん(熱性けいれんを含む)、(5)肝機能障害、黄疸、(6)喘息発作、(7)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(8)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎等)、(9)間質性肺炎、(10)脳炎・脳症、脊髄炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)。このような症状が認められたり、疑われた場合は、すぐに医師に申し出て下さい。なお、健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人又は家族が、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うこととなります。

予防接種を受けることができない人

1. 明らかに発熱のある人(37.5℃を超える人)
2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3. 過去にインフルエンザワクチンの接種を受けて、アナフィラキシーをおこしたことがある人
なお、他の医薬品投与を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いで下さい。
4. その他、医師が予防接種を受けることが不相当と判断した人

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

1. 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液の病気などの人
2. 発育が遅く、医師、保健師の指導を受けている人
3. カゼなどのひきはじめと思われる人
4. 予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発しん、じんましんなどのアレルギーを疑う異常がみられた人
5. 薬の投与又は食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発しんが出たり、体に異常をきたしたことがある人
6. 今までにけいれんを起こしたことがある人
7. 過去に本人や近親者で検査によって免疫状態の異常を指摘されたことがある人
8. 妊娠の可能性のある人
9. 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患のある人

予防接種を受けた後の注意

1. インフルエンザワクチンを受けたあと30分間は、急な副反応が起きることがあります。医療機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
2. 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすことはやめましょう。
3. 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
4. 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けて下さい。